

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ГЕКСИКОН® Д

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование:** Гексикон® Д

**Международное непатентованное наименование:** Хлоргексидин

**Лекарственная форма:** суппозитории вагинальные

**Описание:**

Суппозитории белого или белого с желтоватым оттенком цвета, возможна мраморность поверхности. Суппозитории имеют торпедообразную форму.

**Состав:**

Один суппозиторий содержит: *активное вещество* - хлоргексидина биглюконат – 8 мг (хлоргексидина биглюконат используют в виде раствора (концентрация 20 %)); *вспомогательные вещества*: основа для суппозиторийев - макрогол-1500 (полиэтиленоксид-1500), макрогол-400 (полиэтиленоксид-400) – достаточное количество до получения суппозитория массой 1,50 г.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Антисептическое средство

**Код АТХ:** G01AX.

**Фармакологическое действие**

Гексикон® Д - антисептический препарат для местного (интравагинального) применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, в том числе в отношении *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Herpes simplex II* типа. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий. Гексикон® Д не нарушает функциональную активность лактобацилл.

*Фармакокинетика*

Системная абсорбция при интравагинальном применении незначительная.

## **Показания к применению**

Препарат Гексикон® Д, суппозитории вагинальные, показан для местного лечения инфекций половой сферы у детей, применяется в детской гинекологии у девочек с 6 мес. и до наступления менархе.

Лечение вульвовагинитов (в том числе неспецифических, смешанных, гонорейных, трихомонадных), бактериального вагиноза.

Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз), инфекционно-воспалительных осложнений в детской гинекологии (например, перед оперативным лечением гинекологических заболеваний).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка.

## **Способ применения и дозы**

Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, вводят его во влагалище в положении лежа на спине.

Для лечения: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Для профилактики венерических заболеваний: 1 суппозиторий не позднее 2 часов после полового акта.

## **Побочное действие**

Частота побочных реакций в соответствии с классификацией ВОЗ: очень часто ( $\geq 10\%$ ), часто ( $\geq 1\%$  и  $< 10\%$ ), нечасто ( $\geq 0,1\%$  и  $< 1\%$ ), редко ( $\geq 0,01\%$  и  $< 0,1\%$ ), очень редко ( $< 0,01\%$ ), частота неизвестна (не может быть определена на основании имеющихся данных).

*Редко:* аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата. *Частота неизвестна:* тяжёлые аллергические реакции, включая анафилаксию.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## **Передозировка**

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость суппозиториев вагинальных Гексикон<sup>®</sup> Д, т.к. препарат применяется внутривагинально.

### **Особые указания**

Гексикон<sup>®</sup> Д сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Суппозитории имеют уменьшенный размер, созданный специально для лечения девочек.

### **Форма выпуска**

Суппозитории вагинальные 8 мг. 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом. Одну или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

### **Срок годности**

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Производитель/организация, принимающая претензии**

**АО «НИЖФАРМ», Россия**

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>